

Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Echantillonnage Simple (STOC-EPS)

Résultats du suivi 2026 sur la ZSC Embouchure du Tech et Grau de la Massane (Argelès-sur-Mer)



Groupe Ornithologique du Roussillon

Juillet 2026



Réalisation :

Groupe Ornithologique du Roussillon

4 Rue Béranger

66 000 PERPIGNAN

Terrain : F. Olivier

Traitement des données et rédaction rapport : F. Olivier

Photographie de couverture : Prairie du Tamariguiier (*F. Olivier*)

Introduction

Le programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC), coordonné par le Muséum National d'Histoire Naturel de France (MNHN), a été initié dès 1989. La technique d'échantillonnage ponctuel simplifié (EPS) s'appuie sur des points d'écoute d'une durée de 5 minutes réalisés deux fois au cours du printemps. Le premier passage permet de contacter les espèces nicheuses précoces, tandis que ce sont les nicheurs plus tardifs, souvent migrateurs, qui sont visés par le second. Un total de 10 points d'écoute est préconisé sur chaque site inventorié. L'intégralité de la méthodologie nationale est accessible sur le site internet du Muséum : <http://www2.mnhn.fr/vigie-nature>.

La commune d'Argelès-sur-Mer, co-animateur du site Natura 2000 « Embouchure du Tech et Grau de la Massane », a souhaité mettre en place ce suivi afin de pouvoir appréhender, de façon globale, les changements qui interviennent dans les communautés de passereaux nicheurs, qui constituent un excellent bio-indicateur de l'état de santé des milieux.

Ce rapport présente les résultats de la septième année de suivi, réalisée durant le printemps 2026.

Échantillonnage

Dates des relevés et observateurs :

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
08/04 & 26/05	08/04 & 28/05	08/04 & 30/05	11/04 & 26/05	08/04 & 29/05	07/04 & 03/06	10/04 & 27/05
Q. Giraudon	Q. Giraudon	F. Olivier	F. Olivier	F. Olivier	F. Olivier	F. Olivier



Arrière-dune et pinède au sud du grau de la Riberette (F. Olivier)



Figure 1. Localisation des 10 points d'écoute recensés depuis 2020 dans le cadre du programme STOC EPS sur le site Natura 2000 « Embouchure du Tech et Grau de la Massane »

Résultats du suivi 2026

Tableau 1. Résultats bruts de l'inventaire STOC sur les 10 points d'écoute réalisés au printemps 2026 (toutes espèces confondues, en orange : espèces migratrices).

Espèce	P1-1	P1-2	P3-1	P3-2	P4-1	P4-2	P5-1	P5-2	P6-1	P6-2	P7-1	P7-2	P8-1	P8-2	P9-1	P9-2	P10-1	P10-2	P11-1	P11-2	Somme des effectifs max	Occurrence
Bergeronnette grise								1													1	1
Bouscarle de Cetti	2	3	1	1		1	1									1	2	1	1	1	10	7
Bruant proyer									1	1					2		1				4	3
Bruant zizi	1	1				1			1												3	3
Canard colvert			9																		9	1
Chardonneret élégant					2			1	1	1		1	1	1		3					9	6
Choucas des tours										2											2	1
Cisticole des joncs		1				1	1		1	2	2	2	1		2	2	2	2			12	8
Cochevis huppé													2	3	1	1	1	1			5	3
Corneille noire	2		1				1		1												5	4
Étourneau sansonnet				1		1			10	12		1	15					1			31	6
Fauvette à tête noire	1	3	2		1														1		7	4
Fauvette mélanocéphale	2	1		1		2	2	2	1	1	2		1		1	1	3	1			15	9
Gallinule poule-d'eau					1																1	1
Geai des chênes		1				1															2	2
Goéland leucophée	2	2		1	1	3			10	10	1	6	1		1	2	2	4		1	30	9
Grand Cormoran													1								1	1
Gravelot à collier interrompu														1							1	1
Grimpereau des jardins	2	1		1																	3	2
Grive draine			1		1																2	2
Grive musicienne																			1		1	1
Guêpier d'Europe		2																			2	1
Hirondelle rustique					1		1		3				1		13	2	2		2	1	23	7
Huppe fasciée	1																				1	1
Hypolaïs polyglotte				1		1				1		1						1			5	5
Linotte mélodieuse					3								1			2					6	3
Loriot d'Europe		1		2		1		1		1								1			7	6
Martinet noir									3	15		2							1	2	19	3
Martinet pâle									15												15	1
Merle noir				3						1		1	1	2			1		2	2	10	6
Mésange à longue queue			1																		1	1
Mésange bleue	1				1			1											2		5	4
Mésange charbonnière	5		3	1	3										1		1		3		16	6
Mésange huppée					1						1	1	1			1					4	4
Moineau domestique					1		1		2	2	5	5	10	10	2						21	6
Pic épeichette		1																			1	1
Pie bavarde			1			1		1	2				1	1	1	1		1			8	7
Pigeon ramier	1	12	3	2	3	3	3	3	3	4	3	5	1	2	2	2	1		2	1	37	10
Pipit des arbres					1																1	1
Pipit farlouse													1								1	1
Pipit rousseline																	1				1	1
Pouillot véloce	1																				1	1
Roitelet à triple bandeau	2	1	1	1																1	4	3
Rossignol philomèle	4	4	1	2		4	1	2		1					1	2	1	2	1	1	18	8
Rougegorge familier			2	1															1	1	3	2
Rougequeue noir														1							1	1
Serin cini	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	4	1	1	1	3	1	1	1	2	18	10
Sittelle torchepot			1	1	1															2	4	3
Tourterelle des bois						1															1	1
Tourterelle turque											2				1						3	2
Troglodyte mignon	1	1	1	2															1	1	4	3
Verdier d'Europe							1	1	2		2	1		2	1		1		2	2	11	7

Nom espèce	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Total		
	TOTAL MAX 2020	Occurrence 2020	TOTAL MAX 2021	Occurrence 2021	TOTAL MAX 2022	Occurrence 2022	TOTAL MAX 2023	Occurrence 2023	TOTAL MAX 2024	Occurrence 2024	TOTAL MAX 2025	Occurrence 2025	TOTAL MAX 2026	Occurrence 2026	Somme TOTAUX	Occurrence	Nb années de présence
Aigrette garzette			1	1							1	1			2	2	2
Bergeronnette grise	2	2	2	2	2	2	1	1					1	1	8	8	5
Bouscarle de Cetti	13	7	8	6	8	7	12	8	7	6	6	4	10	7	64	45	7
Bruant proyer					2	2			5	2	5	3	4	3	16	10	4
Bruant zizi	6	5	4	4	4	4	1	1	2	2	2	2	3	3	22	21	7
Buse variable	2	2	3	3	1	1			1	1					7	7	4
Canard colvert	2	1	3	1	3	1			2	1	1	1	9	1	20	6	6
Chardonneret élégant	10	8	11	7	17	6	10	7	7	5	17	9	9	6	81	48	7
Choucas des tours	1	1	1	1									2	1	4	3	3
Chouette hulotte							1	1			3	1			4	2	2
Cigogne blanche					1	1									1	1	1
Circaète Jean-le-Blanc			4	1											4	1	1
Cisticole des joncs	9	6	7	4	7	6	6	4	4	2	9	6	12	8	54	36	7
Cochevis huppé	5	3	5	3	6	3	7	3	6	3	7	4	5	3	41	22	7
Cornelle noire	3	2	1	1	2	2	3	3	3	3	1	1	5	4	18	16	7
Coucou geai			1	1											1	1	1
Épervier d'Europe											2	1			2	1	1
Étourneau sansonnet	12	8	5	4	100	7	40	5	13	5	43	6	31	6	244	41	7
Faucon crécerelle	1	1			3	2									4	3	2
Fauvette à tête noire	8	5	6	5	11	5	9	7	6	4	2	2	7	4	49	32	7
Fauvette mélanocéphale	11	7	8	7	7	5	7	6	11	7	12	7	15	9	71	48	7
Gallinule poule-d'eau	3	3	2	2	1	1							1	1	7	7	4
Geai des chênes	4	4	3	3			4	3	1	1			2	2	14	13	5
Gobemouche gris									1	1	1	1			2	2	2
Goéland leucopnée			5	2	42	7	79	8	36	9	48	7	30	9	240	42	6
Grand Cormoran					1	1							1	1	2	2	2
Gravelot à collier interrompu													1	1	1	1	1
Grimpereau des jardins	5	5	4	4	6	5	4	4	4	4	4	3	3	2	30	27	7
Grive draine					4	4					2	2	2	2	8	8	3
Grive musicienne	1	1			1	1			1	1			1	1	4	4	4
Guépier d'Europe			1	1									2	1	3	2	2
Héron cendré									1	1	1	1			2	2	2
Hirondelle rustique	14	3	10	2	11	7	4	3	6	4	10	5	23	7	78	31	7
Huppe fasciée	6	5	8	5	4	4	5	3	4	4	9	6	1	1	37	28	7
Hypolaïs polyglotte			4	3	3	3	5	4	6	4	4	4	5	5	27	23	6
Linotte mélodieuse	1	1	6	4	1	1			2	2	2	1	6	3	18	12	6
Loriot d'Europe	7	6	8	5	7	5	11	8	10	5	3	3	7	6	53	38	7
Martinet noir	6	2	1	1	14	1	45	4	72	7	59	4	19	3	216	22	7
Martinet pâle							4	1	4	1			15	1	23	3	3
Merle noir	6	3	5	4	7	6	12	8	5	3	6	5	10	6	51	35	7
Mésange à longue queue	1	1	1	1	2	2	1	1			2	2	1	1	8	8	6
Mésange bleue	5	4	4	3	5	5	1	1	3	3	6	6	5	4	29	26	7
Mésange charbonnière	13	8	8	7	14	9	16	8	21	9	13	7	16	6	101	54	7
Mésange huppée					2	2	2	2	4	4	8	8	4	4	20	20	5
Moineau domestique	10	4	16	7	18	4	24	4	19	5	29	6	21	6	137	36	7
Moineau friquet	5	3	2	2	3	2	1	1	2	1					13	9	5
Petit Gravelot	1	1													1	1	1
Phragmite des joncs			1	1											1	1	1
Pic de Sharpe	4	4	1	1	6	5	5	5	1	1	3	3			20	19	6
Pic épeiche	2	2	1	1											3	3	2
Pic épeichette	1	1	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	12	11	7
Pie bavarde	12	8	8	4	16	7	24	8	9	8	11	6	8	7	88	48	7
Pigeon biset domestique	1	1			6	2	8	2							15	5	3
Pigeon ramier	23	10	17	10	34	10	34	9	47	10	58	10	37	10	250	69	7
Pinson des arbres					1	1			1	1					2	2	2
Pipit des arbres					1	1	1	1					1	1	3	3	3
Pipit farlouse											1	1	1	1	2	2	2
Pipit rousseline											1	1	1	1	2	2	2
Pipit spioncelle	1	1													1	1	1
Pouillot de Bonelli	1	1	1	1	1	1	4	3	1	1	1	1			9	8	6
Pouillot fitis	1	1			2	2	4	4	3	2	1	1			11	10	5
Pouillot véloce	1	1	3	2					1	1	1	1	1	1	7	6	5
Puffin indéterminé	4	1	30	1											34	2	2
Puffin yelkouan											6	1			6	1	1
Râle d'eau			1	1											1	1	1
Roitelet à triple bandeau	4	3	1	1	1	1	4	3	4	4	3	3	4	3	21	18	7
Rossignol philomèle	21	10	14	7	18	9	18	9	20	8	16	7	18	8	125	58	7
Rougegorge familier	4	3	4	4	4	4	4	4	2	1	1	1	3	2	22	19	7
Rougequeue à front blanc							2	2	1	1					3	3	2
Rougequeue noir	3	3	4	4	2	2	2	2	4	3	2	2	1	1	18	17	7
Rousserolle effarvatte	1	1	2	2							1	1			4	4	3
Serin cini	15	7	12	9	19	9	24	10	20	9	19	10	18	10	127	64	7
Sittelle torchepot			1	1	1	1	1	1	2	2			4	3	9	8	5
Sterne caugek	2	1													2	1	1
Sterne hansel									2	1					2	1	1
Sterne naine	1	1													1	1	1
Tarier des prés	1	1							1	1					2	2	2
Tarier pâtre					1	1									1	1	1
Tarin des aulnes					1	1					1	1			2	2	2
Torcol fourmilier	1	1													1	1	1
Tourterelle des bois			1	1	2	2	1	1					1	1	5	5	4
Tourterelle turque	6	4	3	2	6	4	1	1	2	2	2	2	3	2	23	17	7
Troglodyte mignon	7	3	7	5	6	5	2	1	4	3	4	3	4	3	34	23	7
Verdier d'Europe	9	6	8	5	11	9	6	5	13	9	14	8	11	7	72	49	7
Nombre d'espèces	54		54		55		46		51		51		52				
Nombre d'espèces nicheuses	47		47		49		42		44		41		45				

Tableau 2. Comparaison des résultats (totaux max = somme des effectifs max. des 10 points) de 2020 à 2026 ; en rouge : espèces migratrices ou non nicheuses localement.

Discussion

Diversité spécifique

En 2026, 52 espèces d'oiseaux ont été contactées sur l'ensemble des 10 points d'écoute. Parmi celles-ci, 45 sont considérées nicheuses sur le site. Cette valeur est la plus haute observée depuis 2021 (maximum de 49 espèces en 2022).

Ainsi, après 3 années de légère baisse de la diversité en nicheurs, qu'elle soit globale ou moyennée par point d'écoute on constate en 2026 un retour à des valeurs correspondant aux premières années de relevés (*Figures 2 et 3*).




Figure 2. Évolution de la diversité en espèces nicheuses sur le site, depuis 2020.




Figure 3. Évolution de la diversité moyenne en espèces nicheuses par point depuis 2020.

Ce constat général n'empêche pas certaines espèces de rester en régression, comme le Grimpereau des jardins, le Pic de Sharpe non contacté en 2026, pour la première fois depuis le début du suivi), la Huppe fasciée, le Rougequeue noir, ou encore le Rossignol philomèle qui demeure cependant toujours abondant sur le site.

Il convient également de souligner la régression des trois espèces de pics nicheuses sur le site. Ce constat demeure toutefois difficile à interpréter. Le Pic épeiche, qui recherche dans le contexte littoral du site les boisements les plus frais, a pu être affecté par les épisodes de sécheresse. En revanche, les deux autres espèces sont a priori mieux adaptées au climat méditerranéen, et aucun élément ne permet aujourd'hui d'attester une régression de leurs populations à l'échelle départementale. Les pics étant des nicheurs précoces, leur détection repose en grande partie sur le premier passage, réalisé en avril. Les dates de prospection étant restées inchangées depuis 2020, l'hypothèse d'un décalage de la phénologie de reproduction peut être envisagée : une nidification plus précoce pourrait ainsi réduire la probabilité de contact lors de ce premier passage.

Enfin , pour la deuxième année consécutive, le Moineau friquet n'a pas été contacté, tandis que la Tourterelle des bois l'a été après deux années sans avoir été entendue.



Les trois espèces de pics (de gauche à droite : Pic de Sharpe, Pic épeiche et Pic épeichette) nichant sur le site sont en régression depuis 2020, sans que la cause ne soit clairement identifiée. (J. Dalmau & L. Marsaud)

Notons enfin une nouvelle espèce nicheuse pour le STOC : le Gravelot à collier interrompu avec une femelle qui couvait sur le haut de plage au point 8 le 27/05. C'est une première documentée aussi loin au sud du grau de la Riberette, qui constitue habituellement la limite de l'aire de nidification de l'espèce sur le littoral du département.



Figure 2. Données de nidification probable (orange) et certaine (rouge) du Gravelot à collier interrompu sur la commune d'Argelès-sur-Mer. Le point le plus au sud concerne l'observation faite d'une femelle couvant au deuxième passage. Source : Faune-France.

Cela porte donc à un total de 82 espèces relevées en 7 années de suivi, dont 61 sont considérées nicheuses. La tendance de l'occurrence de chaque espèce depuis 2020 est présentée dans le **Tableau 3** ci-après.

Tableau 3. Tendances des occurrences des 61 espèces considérées nicheuses sur le site, entre 2020 et 2026.

Nom espèce	Occurrence							Tendance occurrence / an
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Bergeronnette grise	2	2	2	1	0	0	1	-0,32
Bouscarle de Cetti	7	6	7	8	6	4	7	-0,18
Bruant proyer	0	0	2	0	2	3	3	0,54
Bruant zizi	5	4	4	1	2	2	3	-0,43
Buse variable	2	3	1	0	1	0	0	-0,43
Canard colvert	1	1	1	0	1	1	1	0,00
Chardonneret élégant	8	7	6	7	5	9	6	-0,11
Choucas des tours	1	1	0	0	0	0	1	-0,07
Chouette hulotte	0	0	0	1	0	1	0	0,07
Cisticole des joncs	6	4	6	4	2	6	8	0,21
Cochevis huppé	3	3	3	3	3	4	3	0,07
Cornelle noire	2	1	2	3	3	1	4	0,25
Coucou geai	0	1	0	0	0	0	0	-0,07
Étourneau sansonnet	8	4	7	5	5	6	6	-0,14
Faucon crécerelle	1	0	2	0	0	0	0	-0,18
Fauvette à tête noire	5	5	5	7	4	2	4	-0,36
Fauvette mélanocéphale	7	7	5	6	7	7	9	0,29
Gallinule poule-d'eau	3	2	1	0	0	0	1	-0,39
Geai des chênes	4	3	0	3	1	0	2	-0,39
Gobemouche gris	0	0	0	0	1	1	0	0,11
Gravelot à collier interrompu	0	0	0	0	0	0	1	0,11
Grimpereau des jardins	5	4	5	4	4	3	2	-0,43
Grive draine	0	0	4	0	0	2	2	0,21
Grive musicienne	1	0	1	0	1	0	1	0,00
Hirondelle rustique	3	2	7	3	4	5	7	0,54
Huppe fasciée	5	5	4	3	4	6	1	-0,36
Hypolaïs polyglotte	0	3	3	4	4	4	5	0,64
Linotte mélodieuse	1	4	1	0	2	1	3	0,04
Loriot d'Europe	6	5	5	8	5	3	6	-0,14
Martinet noir	2	1	1	4	7	4	3	0,54
Martinet pâle	0	0	0	1	1	0	1	0,14
Merle noir	3	4	6	8	3	5	6	0,29
Mésange à longue queue	1	1	2	1	0	2	1	0,00
Mésange bleue	4	3	5	1	3	6	4	0,14
Mésange charbonnière	8	7	9	8	9	7	6	-0,21
Mésange huppée	0	0	2	2	4	8	4	1,07
Moineau domestique	4	7	4	4	5	6	6	0,18
Moineau friquet	3	2	2	1	1	0	0	-0,50
Petit Gravelot	1	0	0	0	0	0	0	-0,11
Pic de Sharpe	4	1	5	5	1	3	0	-0,43
Pic épeiche	2	1	0	0	0	0	0	-0,29
Pic épeichette	1	3	3	1	1	1	1	-0,21
Pie bavarde	8	4	7	8	8	6	7	0,07
Pigeon biset domestique	1	0	2	2	0	0	0	-0,18
Pigeon ramier	10	10	10	9	10	10	10	0,00
Pinson des arbres	0	0	1	0	1	0	0	0,00
Pouillot de Bonelli	1	1	1	3	1	1	0	-0,11
Râle d'eau	0	1	0	0	0	0	0	-0,07
Roitelet à triple bandeau	3	1	1	3	4	3	3	0,25
Rosignol philomèle	10	7	9	9	8	7	8	-0,25
Rougegorge familial	3	4	4	4	1	1	2	-0,43
Rougequeue noir	3	4	2	2	3	2	1	-0,32
Rousserolle effarvatte	1	2	0	0	0	1	0	-0,18
Serin cini	7	9	9	10	9	10	10	0,39
Sittelle torchepot	0	1	1	1	2	0	3	0,29
Tarier pâle	0	0	1	0	0	0	0	-0,04
Torcol fourmilier	1	0	0	0	0	0	0	-0,11
Tourterelle des bois	0	1	2	1	0	0	1	-0,04
Tourterelle turque	4	2	4	1	2	2	2	-0,29
Troglodyte mignon	3	5	5	1	3	3	3	-0,21
Verdier d'Europe	6	5	9	5	9	8	7	0,32

Abondance

L'abondance du cortège avifaunistique est mesurée à partir de la somme des effectifs maximaux. Seules les espèces considérées comme nicheuses sur la zone sont incluses et les espèces grégaires (Martinets noir et pâle, Étourneau sansonnet, Pigeon ramier, Moineaux domestique et friquet) sont retirées car les observations de grands groupes viennent biaiser la compréhension des valeurs d'abondance.

L'abondance d'oiseaux nicheurs non grégaires en 2026 est de 244 individus, soit une moyenne de 24,4 oiseaux contactés par point. Cette valeur est très élevée et rend compte des fortes densités d'oiseaux nicheurs présentes sur le site, notamment dans les zones buissonnantes et de bocage. Comme la diversité, l'abondance était en régression depuis 2022 mais a de nouveau augmenté en 2026, atteignant même son niveau le plus élevé depuis le début du suivi (**Figure 5** ci-dessous).




Figure 5. Abondance globale des nicheurs (hors espèces grégaires) depuis 2020 sur le site d'étude.

Discussion des évolutions de diversité et d'abondance

La diminution de l'abondance et de la diversité des oiseaux observée sur le site entre 2023 et 2025 pourrait être liée à l'assèchement prolongé des zones humides durant cette période. Cette hypothèse est notamment étayée par le recul marqué des espèces liées à l'humidité dans le contexte local¹ constaté ces dernières années. En 2026, le site du Tamariguièr s'est de nouveau retrouvé en eau suite à des pluies conséquentes fin 2025-début 2026 ramenant le Roussillon à des valeurs d'hydrométrie convenables.

Cette théorie semble se confirmer puisque certaines espèces comme la Gallinule poule-d'eau ont fait leur retour, tandis que d'autres ont vu leurs effectifs de nouveau augmenter (Cisticole des joncs, Bouscarle de Cetti, Fauvette à tête noire notamment).

En conséquence, le nombre cumulé d'occurrences des espèces associées aux zones humides et aux boisements frais augmente nettement en 2026. Cette évolution intervient parallèlement à la forte hausse de la pluviométrie enregistrée depuis l'automne 2025. (**Figure 6** ci-dessous). Bien que cette relation ne suffise pas à établir un lien de causalité direct, elle renforce l'hypothèse selon laquelle la bonne pluviométrie de cette année et la remise en eau du site favorisent un retour à des valeurs de diversité et d'abondance plus élevées. Les mécanismes sous-jacents de cette possible corrélation sont probablement multiples (qualité de l'habitat pour la nidification, ressource alimentaire, ..).




Figure 6. Pluviométrie cumulée des automnes, hiver et printemps précédant chaque relevé STOC (2020 = automne 2019 + hiver 2019/20 + printemps 2020) et évolution des occurrences cumulées des espèces nicheuses liées aux zones humides et boisements frais. (Source : Station météo Perpignan-Rivesaltes).

¹ Cortège « zones humides et boisements frais » : Bouscarle de Cetti, Cisticole des joncs, Fauvette à tête noire, Gallinule poule-d'eau, Grive musicienne, Mésange à longue queue, Pic épeiche, Pinson des arbres, Râle d'eau, Rougegorge familial, Rousserolle effarvatte, Sittelle torchepot, Troglodyte mignon

Enfin, les mesures mises en œuvre sur le site des Tamariguiers, conformément aux orientations de son plan de gestion, ont probablement contribué aux bons résultats observés cette année chez les oiseaux nicheurs. La poursuite de ces actions apparaît donc essentielle pour préserver durablement ce site aussi riche que fragile.



Site du Tamariguiers en eau en avril 2026 (F.Olivier)

Patrimonialité du cortège

Tableau 4. Statut des espèces (considérées nicheuses au moins une année) inscrites sur les listes rouges des oiseaux nicheurs et/ou en Annexe I de la Directive européenne « Oiseaux ». En gras, les espèces contactées en 2026.

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Liste rouge Mondiale	Liste rouge européenne	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection nationale	Directive Oiseaux
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	VU	VU	VU	NT	Moratoire	Annexe II/2
Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i>	LC	VU	LC	EN	Oui	-
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	LC	NT	NT	VU	Oui	-
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	LC	LC	EN	EN	Oui	-
Gravelot à collier interrompu	<i>Anarhynchus alexandrinus</i>	LC	LC	VU	EN	Oui	Annexe I
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>	LC	LC	VU	NT	Oui	-
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	LC	LC	VU	NT	Oui	-
Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>	LC	LC	VU	NT	Oui	-
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	LC	LC	VU	LC	Oui	-
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	LC	LC	VU	LC	Oui	-
Pic épeichette	<i>Dryobates minor</i>	LC	LC	VU	LC	Oui	-
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	LC	LC	NT	NT	Oui	-
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	LC	LC	NT	NT	Oui	-
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>	LC	LC	NT	LC	Oui	-
Fauvette mélanocéphale	<i>Curruca melanocephala</i>	LC	LC	NT	LC	Oui	-
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	LC	LC	NT	LC	Oui	-
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	LC	LC	NT	NT	Non	Annexe II/2
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	LC	LC	NT	DD	Oui	-
Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i>	LC	LC	LC	VU	Oui	-
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	LC	LC	LC	NT	Oui	-
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	LC	LC	LC	NT	Oui	-
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	LC	LC	LC	NT	Oui	-

NT = Quasi menacé ; VU = Vulnérable ; EN = En Danger